

POURQUOI PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

ELIQUIS® permet de fluidifier le sang pour empêcher la formation de caillot sanguin, il est indiqué dans le traitement et la prévention de :

- La **PHLÉBITE** : formation d'un caillot sanguin dans une veine qui bloque la circulation du sang.
- L'**EMBOLIE PULMONAIRE** : caillot de sang qui a migré dans la circulation artérielle pulmonaire.
- L'**ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL** : obstruction ou rupture d'un vaisseau sanguin qui provoque un arrêt d'oxygénation au niveau cérébrale.
- La **FIBRILLATION ATRIALE** : trouble du rythme cardiaque qui provoque une accumulation de sang dans les cavités du cœur avec risque de formation de caillot

COMMENT BIEN PRENDRE MON MÉDICAMENT ?

- Prendre ELIQUIS® 2 fois par jour matin et soir **pendant ou après les repas à heure fixe**.
- Toujours respecter la dose prescrite par votre médecin.
- Ne **JAMAIS** doubler la dose pour compenser un oubli
- Délai de **6h** pour prendre le comprimé oublié. Si le délai est dépassé, attendre la prochaine prise.

CONSEILS LIÉS À LA PRISE D'ELIQUIS®

Avertissez chaque professionnel de santé (médecin, pharmacien, biologiste, infirmière, dentiste, gynécologue, kinésithérapeute, pédicure...) que vous prenez un traitement anticoagulant : **mentionnez le nom du médicament et la dose**.

Il est conseillé de porter en permanence une carte de surveillance ELIQUIS® remise par votre pharmacien ou votre médecin.

Toujours consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un médicament ou des compléments alimentaires même s'ils vous paraissent anodins.

Certaines activités sont à risque tel que les activités à risques de chutes (sport extrême et violent...) ou à risques de blessures (couteau, ciseau, coupe ongle...)

- Prendre les précautions nécessaires concernant les tapis, le jardinage, ou les travaux manuels.
- Utilisez plutôt un rasoir électrique
- Pas d'injection intramusculaire
- Utilisez une brosse à dents souple pour éviter de blesser vos gencives.
- Si vous vous blessez, faites un pansement compressif afin de limiter le saignement
- Si vous recevez un coup, mettez de la glace localement pour éviter la formation d'un hématome.

Pensez à toujours prendre votre médicament avec vous en cas de déplacement ainsi que votre ordonnance.

QUE FAIRE EN CAS DE SAIGNEMENT ?

Il existe des :

- **Saignements externes** : hématome important, sang dans les urines, saignement de nez, œil rouge, vomissement de sang...
- **Saignements internes** : fatigue et pâleur inhabituelle, essoufflement anormal, maux de têtes ne cédant pas au traitement, malaise inexpliqué...

Contactez votre médecin en cas de saignements mineurs ou majeurs. **Si les symptômes persistent ou en cas de saignement importantappelez immédiatement le 15.**

COMMENT NE PAS OUBLIER MON TRAITEMENT ?

L'oubli fréquent du traitement augmente les **risques de complications** en formant des caillots. Pour éviter cela certaines astuces peuvent vous aider :

- Placez des posts it dans des endroits de la maison fréquentés
- Mettez un rappel sur votre téléphone
- Placez vos médicaments dans des endroits stratégiques
- Associer la prise de votre anticoagulant à un geste quotidien
- Utilisez un pilulier

QUEL EST LE RISQUE EN CAS DE SOUS DOSAGE ?

Le risque est la formation de caillot sanguin.

Certains signes doivent vous alerter :

- **Douleurs dans le mollet**
- **Douleurs à la poitrine**
- **Difficultés à respirer**

Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un de ces signes.

QUE RETENIR ?

- ✓ Connaissez le nom de votre médicament.
- ✓ Respectez les doses prescrites et prenez vos comprimés à la même heure chaque jour.
- ✓ Prévenez votre médecin en cas de saignement ou d'hématome.
- ✓ Ne prenez pas d'autre traitement sans l'avis de votre médecin.
- ✓ N'arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement anticoagulant sans l'accord de votre médecin.
- ✓ Signalez à tout professionnel de santé que vous êtes sous traitement anticoagulant.

FICHE D'INFORMATION PATIENT

ELIQUIS®

2,5 mg et 5 mg
APIXABAN

